



**Betegtájékoztató és Beleegyző Nyilatkozat
az Immuno-Onkológiai Terápiához**

Beteg neve:	Anyja neve:
Szüil. hely, idő:	TAJ:
Lakcím;	Dátum:

Kedves Betegünk!

Gyógyulása reményében orvosai immuno-onkológiai terápiát javasolnak önnek. Ez a kezelési mód a szervezet daganatellenes védekezőképességének helyreállításában igyekszik segíteni.

Az immuno-onkológiai terápia célja:

Az immuno-onkológiai terápia célja, hogy a szervezet saját, daganatellenes immunvédekezését helyreállítsa a daganatos sejtek által hatástalanná tett állapotából. Közös cél, hogy az immuno-onkológiai szerek alkalmazásával a daganat növekedésének megállítását, a tumor méretének csökkenését, lehetőség szerint kimutatható daganat nélküli állapotot érjünk el, enyhítsük az Ön tüneteit (*pl. fájdalom*), és a lehetőségekhez képest a legjobb életminőséget biztosítsunk az ön számára.

Hogyan hat az immuno-onkológiai terápia?

Nem közvetlenül az osztódó daganatos sejteket pusztítja el, hanem a szervezet saját, immunvédekezésben résztvevő sejtjeit (*limfociták*) mozgósítja és aktivizálja. Az immuno-onkológiai terápia hatása lassan (*átlagosan 2-3 hónap alatt*) alakul ki. A kezelési mód sajátosságából adódóan előfordulhat, hogy a daganat mérete a kezdeti időszakban akkor is növekszik, ha a terápia sikeres.

A kezelés a következő esetekben tekinthető hatásosnak: megáll a daganat növekedése; csökkenni kezd a tumor mérete; vagy teljesen eltűnik a daganat. A kezelés hatásossága esetén ezt a terápiát általában hosszabb ideig alkalmazzuk. Az immuno-onkológiai kezelés hatása hosszan fennmaradhat. Ez érvényes a gyógyszer adagolásán túli időszakra is.

A lehetséges mellékhatások:

Az immuno-onkológiai terápia a szervezet immunrendszerét módosítja, így főként ebből fakadnak mellékhatásai. A kezelés alatt súlyos, nagyon ritkán akár halálos mellékhatások léphetnek fel. Egyidejűleg több mellékhatás is jelentkezhet. Azonnal értesítse vagy keresse fel kezelőorvosát, ha bármilyen mellékhatást tapasztal. Kezelőorvosra egyéb gyógyszereket adhat Önnek, hogy megelőzze a súlyosabb szövődeményeket, és csökkentse az Ön tüneteit.

- I. A tüdőben nem fertőzőes eredetű tüdőgyulladás alakulhat ki, melynek kezdeti tünete lehet a száraz köhögés, légszomj, mellkasi fájdalom.
- II. A bélnyálkahártya gyulladással megbetegedése jöhet létre, melynek jele lehet hasmenés, hasi fájdalom, szurokséklet, hányinger, hányás.
- III. A hormonmirigyek (*különösen a pajzsmirigy*) gyulladással megbetegedése alakulhat ki. Tünete lehet; gyors szívverés, súlyváltozás, fokozott verejtékezés, hajhullás, hidegérzet, székrekedés, mélyülő hang, izomfájdalom, szédülés, ájulás, tartós vagy szokatlan fejfájás.
- IV. A máj gyulladása léphet fel, amely hányingerrel, étvágycsökkenéssel, hasi fájdalommal, a bőr és szemfehérje sárgás elszíneződésével, sötét színű vizelettel, vérékenységgel járhat.
- V. A vesék gyulladása fordulhat elő, amely megváltozott mennyiségű vagy színű vizelettel járhat.
- VI. 1-es típusú cukorbetegség alakulhat ki, amely a szokásosnál fokozottabb étvágygal vagy szomjúsággal, gyakoribb vizeletürítési ingerrel, vagy fogyással járhat.

A jelenlegi járványügyi helyzetben teljeskörű tájékoztatást kaptam a tervezett beavatkozás tekintetében, köztük a koronavírus vizsgálatok és tesztek szükségességéről, elvégzéséről és díjáról.

beteg aláírása: _____