

Mellkascsapolás

Betegbeleegyező nyilatkozat

1. A javasolt gyóymódról, mely (magyarul): 1. a. mellkas csapolás

A klinikai állapota teszi ezt szükségessé:

1.a.a. különböző folyadék felszaporodása a mellhártya lemezei között (vér, genny, nyirokfolyadék)

2. Mellkas csapolás kivitelezése:

A megfelelő (általában ülő) testhelyzet felvétele után a bőr fertőtlenítését és a bőr alatti szövetek érzéstelenítését követően a beavatkozást végző orvos tűt-vagy vezetődróttal ellátott szilikoncsövet vezet a mellkasba. A mellhártya üregbe jutva a vezetődrót eltávolításra kerül, a szilikoncsövet pedig mélyebbre vezetjük és az ott lévő folyadékot, eltávolítjuk. A folyadék lebocsátása után a bőr fertőtlenítése és steril fedése történik.

2.a. Javasolt gyóymód kockázatai, szövődményei:

Mint minden beavatkozásnak ennek is vannak veszélyei, szövődményei, melyet igyekszünk elhárítani, minimálisra csökkenteni. Lehetséges szövődmények: vérzés a behelyezés helyén, tüdőszérülés, a mellüregben futó ér sérülése, rekeszizom vagy hasi zsigeri szervek sérülése szúrásakor. Fertőződés előfordulhat a szúrás helyétől a mellkasig bárhol. Rossz mellkasi cső helyzet, bőr alatti levegőgyűlem kialakulhat.

A multirezisztens kórokozókkal történő kolonizáció/ fertőzés a betegellátás, kórházi kezelés során nem zárható ki.

Kelt: Edelény, 201

beleegyező aláírása